



**SZCZEPIENIOM PRZECIW**

**HPV**

**W SZKOŁACH**

**Apel do rodziców!  
Nie dajcie się okłamywać!**

- Zaszczepienie przeciwko wirusowi HPV **NIE DAJE OCHRONY** przed zachorowaniem na raka szyjki macicy, np. w Australii przed wprowadzeniem szczepień na HPV, odnotowywano mniej zachorowań (2006 r.- 6,8 na 100 tys. kobiet), niż po kampanii szczepień (2018 r.- 7,3 na 100 tys. kobiet).
- Rozwój raka szyjki macicy trwa kilkadziesiąt lat, a badania nad szczepionkami prowadzono w cyklach zaledwie ok. 5 letnich. Nie przeprowadzono badań nad skutkami dla grupy wiekowej 9-13 lat.  
▶ **To eksperyment na naszych dzieciach!**
- Rak wynika z różnych współistniejących przyczyn:
  - Wczesne rozpoczęcie życia seksualnego = brak dojrzałości tkanek szyjki macicy.
  - Kontakty seksualne z wieloma partnerami = choroby przenoszone drogą płciową.
  - Infekcje wirusowe o różnym podłożu, np. chłamydia, różne inne typy wirusów HPV (na które nie ma szczepionki!) opryszczka, deficyty odporności.

**SZCZEPIENIE NA HPV TO WIĘCEJ SZKODY NIŻ POŻYTKU!**

Skuteczna profilaktyka przeciwko rakowi szyjki macicy to:

- regularne badania cytologiczne i kolposkopia
- abstynencja seksualna w okresie dorastania
- życie w stałym, wiernym związku.

**UWAGA!**

